



Consentimiento de colocación de dispositivo intrauterino (DIU)

_____ : realizará la colocación del dispositivo intrauterino (DIU).

(Print First/Last Name & Credentials)

Solicito la colocación de (marque uno): Mirena / Skyla / Paragard (DIU de cobre) / Kyleena

No deseo embarazarme en este momento. He hablado con mi médico para estar segura de que no estoy embarazada en el momento de la colocación del DIU.

- Paragard previene el embarazo durante 12 años y se puede utilizar como anticonceptivo de emergencia.
- Mirena y Liletta previenen el embarazo durante 8 años
- Mirena trata el sangrado menstrual abundante durante 5 años
- Kyleena previene el embarazo durante 5 años
- Skyla previene el embarazo durante 3 años

Entiendo que puedo retirar el DIU en cualquier momento. Los DIU no protegen contra las infecciones por VIH (SIDA) ni otras infecciones de transmisión sexual.

Otros profesionales distintos al mencionado anteriormente, incluidos, entre otros, estudiantes/residentes, realizarán tareas importantes relacionadas con el procedimiento, de acuerdo con la política del hospital y, en el caso de los estudiantes/residentes, en función de sus habilidades y bajo la supervisión del profesional responsable.

El médico me ha explicado, en una manera que entiendo, el tratamiento previsto, los beneficios esperados, los riesgos materiales o los posibles problemas que podrían surgir durante el tratamiento o durante la recuperación. También me han informado sobre terapias alternativas, incluida la opción de no recibir tratamiento, así como los beneficios y riesgos esperados asociados con esos tratamientos alternativos.

Entre los riesgos o preocupaciones analizados se encuentran los siguientes:

- Desmayo, sangrado o dolor durante o después del procedimiento
- Imposibilidad para colocar el DIU hoy
- Expulsión: el DIU puede salir del útero. Si esto ocurre, puede quedar embarazada. Embarazo: si utiliza el DIU como método anticonceptivo, existe una pequeña posibilidad de que quede embarazada mientras el DIU se encuentra en su útero. Si cree que podría estar embarazada, entienda que debe buscar atención médica de inmediato. Existe la posibilidad de que el embarazo sea fuera del útero (embarazo ectópico o tubárico). Esto podría poner en peligro su vida.
- Infección: el tratamiento generalmente es con medicamentos
- Lesión en el útero (perforación): el DIU o los instrumentos utilizados para colocarlo pueden perforar la pared del útero. El tratamiento puede requerir cirugía.
- Hilos/filamentos del DIU perdidos: es posible que necesite un estudio por imágenes para localizar el DIU en su útero. Es posible que se necesiten procedimientos adicionales para extraer el DIU.
- Reacción alérgica

Los efectos secundarios del DIU incluyen:

- Calambres uterinos
- Sangrado irregular o manchado durante los primeros 3-6 meses
- Cambios en el flujo vaginal
- DIU Paragard: mi sangrado menstrual puede volverse más abundante o durar más tiempo
- DIU hormonal (Mirena, Liletta, Kyleena, Skyla):
 - Mi sangrado menstrual puede volverse más ligero o desaparecer por completo; esto no es peligroso
 - Quistes en los ovarios
 - Efectos secundarios hormonales

El médico me ha preguntado si deseo una explicación más detallada sobre lo anterior y si tengo preguntas adicionales. Mis preguntas han sido respondidas. Se me han explicado detalladamente los procedimientos, tratamientos, otros procedimientos alternativos, métodos de tratamiento y riesgos. Estoy satisfecha con las explicaciones de mi médico. Doy mi permiso y consentimiento para el/los tratamiento(s) o procedimiento(s) arriba especificado(s):

Firma del paciente

Nombre y apellido impresos (en mayúsculas)

Fecha y hora

I EXPLAINED THE ABOVE PROCEDURE(S) OR TREATMENT TO THE PATIENT:

Qualified Personnel's Signature

Printed First & Last name

Date and Time